


Dynali®

Fungicida indicado para combate ao oídio da videira.

Formulação / Composição

Concentrado dispersível (DC) contendo 30 g/L ou 2,8 % (p/p) de ciflufenamida e 60 g/L ou 5,6 % (p/p) de difenoconazol.

Modo de Ação

O **DYNALI®** é um fungicida com ação preventiva e curativa composto por duas substâncias ativas: a ciflufenamida, com ação de vapor, mobilidade translaminar, atividade preventiva e curativa, do grupo fenilacetamida, com modo de ação bioquímico desconhecido (Grupo FRAC - U 06) e o difenoconazol com mobilidade translaminar, atividade preventiva, curativa e anti-esporulante, do grupo IBE, inibidor da biossíntese dos esteróis, que atua na demetilação – DMI (Grupo FRAC – 3). A combinação do difenoconazol e da ciflufenamida, permite obter um fungicida com base em substâncias ativas de grupos químicos diferentes para o controlo do oídio da videira.

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com FRAC:

GRUPO	3	U 06	FUNGICIDA
-------	---	------	-----------

Finalidades / Condições de Utilização

Cultura	Doença	Dose/Conc. (mL/hL)	Recomendações	Intervalo de Segurança (dias)
Videira	Oídio (<i>Erysiphe necator</i>)	50-65 mL/hL (máximo 650 mL/ha)	Os tratamentos devem realizar-se de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, iniciar os tratamentos a partir dos cachos visíveis. A persistência biológica do produto é de 12-14 dias, sendo o intervalo mais curto usado em condições de maior risco ou pressão da doença. Número máximo de aplicações: 2	21

Proteção Integrada

Segundo a **Diretiva do Uso Sustentável** (Diretiva 2009/128/CE) que foi transposta para a **Lei nº 26/2013** (a 11 de Abril), é obrigatória a aplicação dos princípios gerais da Proteção Integrada por todos os utilizadores profissionais. Cumpridos esses princípios gerais, **todos os produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, para o combate aos inimigos das culturas são passíveis de ser utilizados em Proteção Integrada.**

LMR

Informação relativa aos **LMRs**, consultar a informação na página oficial da EU: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides_en

Modo de Preparação da Calda e Utilização

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.
Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda

no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda a utilizar: 200 a 1000L/ha.

Precauções Biológicas

Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar, no máximo, 2 tratamentos por campanha com **DYNALI**[®] ou com outros fungicidas que também contenham ciflufenamida. Respeitar o número máximo de 3 tratamentos admitidos por campanha com fungicidas do grupo dos DMI. O **DYNALI**[®] não deve ser aplicado em locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia após a aplicação do produto ou de outros produtos com o mesmo modo de ação, existentes no mercado.

Na eventualidade de serem necessárias mais aplicações contra o oídio, utilizar, em alternância, por exemplo o TOPAZE, o TALENDO, o THIOVIT JET, o QUADRIIS ou o QUADRIIS MAX.

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

ATENÇÃO

- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Evitar a libertação para o ambiente.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem
- Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.
- Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Embalagens

100 mL, 1 L e 5 L .

Autorização de venda n.º 00328 concedida pela DGAV

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA
ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM.**

FT: 100723