

Orvego[®]

Directo da terra
para o consumidor
em segurança

Inovação e Tradição num só produto

Inovação e Tradição num só produto

Orvego é um fungicida à base de **Initium®** e dimetomorfe para o controlo do Míldio do tomate, batata, cucurbitáceas e pimento.


A Melhor defesa contra do míldio. **Orvego**, fungicida inovador à base de **Initium®** e **dimetomorfe**, elemento de confiança no programa de defesa contra o míldio das culturas hortícolas. A alta eficácia do produto deve-se à acção complementar das duas substâncias activas fazde **Orvego** uma arma mais moderna para os agricultores, mesmo em casos de alta pressão de doença e um excelente parceiro no contexto de estratégias anti-resistências.

Vantagem para o Agricultor:

- Elevada eficácia e alta qualidade na colheita.
- Versatilidade e Flexibilidade.
- Excelente Parceiro para uma estratégia de anti-resistências.
- Intervalo de Segurança Curto.
- Selectivo para auxiliares.

MODO DE ACÇÃO:

Orvego combina, de modo exepcional, o mecanismo de 2 princípios activos; permitindo controlar quase todas as fases do ciclo de vida do Míldio, desde a germinação até à esporulação.




Dois parceiros complementares e fiáveis num só produto, resultando da mais recente investigação da BASF, **Initium®** representa a inovação para as hortícolas, é a primeira molécula da nova família química pirimidilamina, com um novo modo de acção e excelentes níveis de eficácia contra o míldio quando aplicado preventivamente.

Dimetomorfe é a referência entre os mais tradicionais, a sua acção é rápida e com capacidade curativa. É o parceiro ideal para o **Initium®**, juntos são um par eficaz e de segurança inigualável.

Resistência ao arrastamento pela água

Depois da aplicação, **Initium®** penetra rapidamente nas camadas cerosas, impedindo que seja lavado pela chuva.



Condições de aplicação:

Para beneficiar da mais alta eficácia de **Orvego** deve aplicá-lo preventivamente, em períodos críticos de desenvolvimento da doença. Para todas as culturas os tratamentos devem ser realizados a cada 7-10 dias.

Batateira	Doenças	Dose	Época de Aplicação	IS
Batateira	Míldio	0,8 l/ha	Os tratamentos devem ser realizados com carácter preventivo, de acordo com os Serviços de Aviso. Na falta destes iniciar os tratamentos quando as plantas se tocam na linha e em condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento da doença, ou logo que se verifiquem as primeiras contaminações.	7
Tomateiro (ar livre e estufa)				Aplicar o produto de forma preventiva, ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença.
Pimenteiro(estufa)				
Courgete(estufa)				
Pepino (ar livre e estufa)				
Melão (ar livre e estufa)				

Deve efectuar 3 tratamentos por campanha para as culturas da batata, tomate, pimento e beringela e 2 tratamentos para courgete, pepino e melão, com **Orvego**, devendo praticar alternância de fungicidas com modos de acção diferentes, de modo a evitar o desenvolvimento de resistências.



Nome	Orvego®
Composição	27% amectotradina e 20,3% de dimetomorfe
Formulação	Suspensão Concentrada (SC)
Classificação	Nocivo
Embalagens	0,8 L e 5 L
APV	4040

BASF Portuguesa S.A.
 Rua 25 de Abril, N.º1
 2685-368 Prior-Velho

Tel. 21 949 99 00
 Fax. 21 949 99 45

www.agro.basf.pt

10 gestos responsáveis

ANTES DA APLICAÇÃO



DURANTE



DEPOIS DA APLICAÇÃO

