L1028404 PORT/02V PPE 4076384

GEOXE®

syngenta®

Fungicida de superfície, indicado para combater a podridão cinzenta dos cachos em videira e podridões de conservação dos frutos causadas por *Gloeosporium* spp. e *Penicillium expansum* em pomóideas

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 50% (p/p) de fludioxonil

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Reserved for barcode

Leave area blank

Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Torre Fernão Magalhães 43 - 11º Piso – 1990-084 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00 / Fax: 21 794 32 30
www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

1 Kg

Os nomes dos produtos assinalados com ® ou ™ , a ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON são marcas registadas da Syngenta Group Company

TM

	DESCRIPTION:	SCALE:	ISSUE NO:	ISSUE DATE:	330016
	LBL S T+T PANEL RH 100X115 MM	1:1	SYN002	04.10.2011	

SU AGI Code: 59298

O **GEOXE®** é um fungicida à base de fludioxonil, pertencente ao grupo dos **fenilpirrol**. É um fungicida de superfície com atividade preventiva (inibe a germinação do esporo e o crescimento do tubo germinativo). O fludioxonil estimula a síntese do glicerol, um regulador da pressão osmótica intercelular dos fungos.

O **GEOXE®** é indicado para combater, as doenças indicadas nas culturas abaixo mencionadas:

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Doença	Dose kg/ha	Condições de aplicação	Intervalo de segurança (dias)
Vinha (Uva de mesa e de vinificação)	**Podridão cinzenta** (*Botrytis cinerea*)	0,7 - 1	Iniciar os tratamentos, preventivamnete quando se verificarem condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. Aplicar na floração/alimpa e pintor. Em anos e/ou condições muito favoráveis ao desenvolvimento da doença, poderão efetuar-se aplicações ao fecho dos cachos e 3-4 semanas antes da colheita, não excedendo metade do número total de tratamentos anti-botritis. Utilizar a dose superior em situações de forte pressão da doença.	uva de mesa 7 uva de vinificação 21

28405_100x115_lft_BA.indd 2 06/03/17 13:

Cultura	Doença	Dose kg/ha	Condições de aplicação	Intervalo de segurança (dias)
Macieira Pereira	**Podridões de conservação dos frutos** causadas por: *Gloeosporium* spp. *Penicillium expansum*	0,45	Aplicar desde a floração até próximo da colheita, quando as condições forem favoráveis ao desenvolvimento das doenças. Realizar no máximo 2 aplicações por ano, com este produto ou outro que contenha fenilpirrol.	3

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Para evitar o desenvolvimento de resistências, na cultura da vinha, realizar no máximo 1 a 2 aplicações por ano com este produto ou outro que contenha **fenilpirrol**, não excedendo metade do número total de tratamentos anti-botritis.
- Para evitar o desenvolvimento de resistências em pomóideas, realizar no máximo 2 aplicações por ano, com este produto ou outro que contenha **fenilpirrol** (campo e armazém).
- Não aplicar este produto nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

28405_100x115_lft_BA.indd 3 06/03/17 13:

MODO DE APLICAÇÃO

Para aplicação em culturas arbustivas e arbóreas:

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

O **GEOXE®** não é corrosivo relativamente ao material de aplicação. No entanto, depois de cada tratamento, deve lavar-se o material de aplicação utilizado e passar várias vezes com água simples, após a prévia remoção dos bicos e dos filtros que devem ser lavados separadamente.

28405_100x115_lft_BA.indd 4 06/03/17 13:

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO

- Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Evitar respirar as névoas/nuvem de pulverização.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Usar luvas de proteção.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em videira e de 15 metros em macieira e pereira, em relação às águas de superfície.
- Impedir o acesso de pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado, ou usar luvas e vestuário de proteção adequado.
- Intervalo de Segurança – 3 dias em macieira e pereira; 7 dias em videira de uvas de mesa e 21 dias em videira de uvas para vinificação.

28405_100x115_lft_BA.indd 5 06/03/17 13:

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 808 250 143.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de receção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Autorização de venda **n.° 0561**, concedida pela DGAV

Lote nº

28405_100x115_lft_BA.indd 6 06/03/17 13:

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Para evitar o desenvolvimento de resistências, na cultura da vinha, realizar no máximo 1 a 2 aplicações por ano com este produto ou outro que contenha **fenilpirrol**, não excedendo metade do número total de tratamentos anti-botritis.
- Para evitar o desenvolvimento de resistências em pomóideas, realizar no máximo 2 aplicações por ano, com este produto ou outro que contenha **fenilpirrol** (campo e armazém).
- Não aplicar este produto nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO

- Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Evitar respirar as névoas/nuvem de pulverização.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Usar luvas de proteção.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em videira e de 15 metros em macieira e pereira, em relação às águas de superfície.
- Impedir o acesso de pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado, ou usar luvas e vestuário de proteção adequado.
- Intervalo de Segurança – 3 dias em macieira e pereira; 7 dias em videira de uvas de mesa e 21 dias em videira de uvas para vinificação.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 808 250 143

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de receção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

valorfito

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Autorização de venda **n.° 0561**, concedida pela DGAV

Lote nº

Mod.: 171016 **L1028405** PORT/02V

SU AGI Code: 59298 PPE 4076385