



Cabrio® WG

Fungicida polivalente
de amplo espectro de ação

 **BASF**

We create chemistry

 **AgCelence®**



Cabrio® WG

Composição: 200g/kg Piraclostrobina

Formulação: Grânulos dispersíveis em água, WG

Autorização de venda nº1138 concedida pela DGAV


Cabrio® WG é o novo fungicida BASF constituído pela substância ativa piraclostrobina. Esta estrobilurina da nova geração, associa a eficácia sobre um largo espectro de fungos fitopatogénicos a uma rápida penetração na folha e uma elevada persistência na planta.

Cabrio® WG é eficaz no controlo das seguintes doenças:

- Gafa (*Colletotrichum gloeosporioides* e *Colletotrichum acutatum*) e Olho-de-pavão (*Spilocaea oleagina*) na oliveira
- Alternariose (*Alternaria* spp.) na tangerineira, laranjeira e limoeiro.

Cabrio® WG:

Rápida penetração e movimento translaminar.



**F500® dá-nos uma proteção:
Interna e externa.**

Poucos minutos depois da aplicação, parte do produto penetra na folha e a outra fica adsorvida na camada cerosa da epiderme, evitando que o produto seja lavado pela chuva.

Substância ativa

Piraclostrobina (F500®)

Família química:

Estrobilurinas

Oliveira:



Cultura	Oliveira
Doença	Gafa Olho-de-pavão
N.º máx. de aplicações	2 aplicações por ano
Dose	0,5 kg / ha
Persistência biológica	21 dias
Recomendações de aplicação	Os tratamentos deverão ser realizados com carácter preventivo, de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destes, iniciar os tratamentos na primavera ao início das condições favoráveis à infeção (tempo húmido e/ou chuvoso). Este produto destina-se apenas a tratamentos de primavera.
Intervalo de segurança	83 dias

Citrosos:



Cultura	Laranjeira Tangerineira* Limoeiro*
Doença	Alternariose
N.º máx. de aplicações	4 aplicações por ano
Dose	1,125 kg / ha
Persistência biológica	14 dias
Recomendações de aplicação	Os tratamentos deverão ser realizados com carácter preventivo, iniciando-os quando as condições climáticas favorecerem a doença. Nos tratamentos outonais deve ter-se em atenção o abaixamento da temperatura e a ocorrência das primeiras chuvas.
Intervalo de segurança	21 dias

* uso menor

Época de aplicação:



10 gestos responsáveis



BASF Portuguesa S. A.
Rua 25 de Abril, nº 1
2685-368 Prior Velho
Tel. 219499900
www.agro.basf.pt