

# Enervin® SC

Suspensão concentrada (SC), contendo 200 g/L ou 19,2% (p/p) de ametoctradina.

Fungicida preventivo eficaz no combate do míldio da videira  
(*Plasmopara viticola*).

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O  
AMBIENTE  
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de Venda n.º 755 concedida pela DGAV

Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local  
da embalagem

Contém: **5 Litros**

 **BASF**  
We create chemistry

81127215 PT1078

® = Marca registrada de BASF



O **ENERVIN SC**<sup>®</sup> é um fungicida preventivo de superfície, composto pela ametoctradina, substância ativa nova, pertencente ao grupo das pirimidilaminas com atividade preventiva, pertencente ao grupo dos QoSI, inibe a respiração mitocondrial do Complexo III, ao nível do citocromo bc1, fixando-se na estigmatelina.

O **ENERVIN SC**<sup>®</sup> apresenta afinidade lipofílica e de redistribuição à superfície dos órgãos tratados, apresentando resistência à lavagem pela chuva que ocorra 1 hora após a aplicação.

### **Utilização, concentrações e épocas de aplicação**

#### **Vinha**

Míldio (*Plasmopara viticola*): 150 ml/hl (correspondendo a uma dose de 1,5 l/ha).

Os tratamentos deverão ser realizados com carácter preventivo, de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destas, iniciar os tratamentos no estado 7 a 8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados enquanto as condições climáticas favorecerem a doença.

Utilizar a dose máxima na altura da plena vegetação.

A persistência biológica do produto é de 12-14 dias, devendo ser reduzida para 10-12 em condições de elevada pressão da doença.

Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 3 tratamentos por campanha, com este produto ou outros que contenham ametoctradina - QoSI.

Não realizar mais do que 2 tratamentos consecutivos. Alternar o uso do produto com outros de diferente modo de ação.

Volume de calda: 400-1000 L/ha

### **Precauções biológicas**

Para evitar o desenvolvimento de resistência, realizar no máximo três tratamentos por campanha com este ou outro fungicida do grupo QoSI.

Realizar no máximo duas aplicações sucessivas, praticar a alternância com fungicidas de diferentes modos de ação.

### **Modo de preparação da calda**

No depósito onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogêneo. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogênea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

### **Modo de aplicação**

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas)

Na fase inicial de desenvolvimento da vinha aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

### **NOTA**

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

# Enervin® SC

**Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais**

**EUH 210** Ficha de Segurança fornecida a pedido

**H412** Nocivo para organismos aquáticos com efeitos duradouros

**Indicações de Precaução (Prevenção):**

**P270** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto

**Indicações de Precaução (Eliminação):**

**P501** Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

**EUH208** Contém 1,2-benzisotiazolin-3-ona + 2-metil-4-isotiazolin-3-ona em solução aquosa. Pode provocar uma reacção alérgica.

**SP1** – Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos, Telef.: 808 250 143.

**Intervalo de segurança:** 35 dias em vinha.



**SPPT1** A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

## NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

**BASF PORTUGUESA S.A.**

**Rua 25 de Abril, 1**

**2689-538 Prior Velho**

**Telefone: 219499900**

**Fax: 219499949**

