

# **AVISOS AGRÍCOLAS**



Estação de Avisos da Bairrada

NDICE Circular no 4/19

## Anadia, 26 de Abril de 2019

# **VINHA**

#### MÍLDIO

A persistência de tempo chuvoso pode ter condicionado não apenas a realização do tratamento recomendado na última circular, como também o sucesso do mesmo. Assim, sugere-se a realização imediata de um tratamento, de preferência antes da queda de chuva prevista para meados da próxima semana, dia 1 de Maio.

#### OÍDIO

As condições de humidade com aumento da temperatura são propicías à instalação e desenvolvimento desta doença. Adicione um anti-oídio à calda.

#### Podridão Cinzenta

Detetamos a presença de sintomas a nível das folhas. Reforça-se a recomendação constante da última circular, particularmente para as parcelas com histórico desta doença.

#### PODRIDÃO NEGRA (BLACK ROT)

Mantém-se a recomendação de adoção de uma estratégia de luta combinada com a do míldio e do oídio.

#### **OLIVAL**

## OLHO DE PAVÃO

Face às condições meteorológicas previstas recomendase a renovar a proteção do olival.

#### ALGODÃO

Já se observa a presença da praga em algumas parcelas. Caso contabilize 25% das inflorescências atacadas, aplique um inseticida à base de : deltametrina, dimetoato ou lambda-cialotrina, dirigindo o jato apenas aos focos da praga nas árvores atacadas.

# CARUNCHO

Já se observam os orifícios a expelir serrim nos ramos de poda deixados no olival. Proceda à retirada deste material do olival, destruindo-o preferencialmente por incineração (queima).

# XYLELLA FASTIDIOSA – INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA

A Xylella fastidiosa é uma bactéria de quarentena que tem como hospedeiros um grande leque de espécies vegetais entre as quais: Oliveira, Amendoeira, Citrinos, Loendros, Carvalhos, entre outras.

Os sintomas mais frequentes são o amarelecimento ou acastanhamento da bordadura ou ápice das folhas e a morte de ramos.

Caso detete sintomas que se lhe afigurem suspeitos contacte os serviços da Direção Regional de Agricultura

# **POMÓIDEAS**

## **P**EDRADO

Renove a proteção do seu pomar, posicionando o tratamento preferencialmente antes da queda de precipitação.

## COCHONILHA DE S. JOSÉ

Já detetamos a saída das primeiras ninfas móveis. Observe o seu pomar, em particular aqueles onde se tenha notado sintomas/sinais da praga no ano anterior. Caso detete a presença da praga deve efetuar um tratamento com um inseticida à base de deltametrina, espirotetramato, piriproxifena ou sulfoxaflor.

# AFÍDEOS- PIOLHO VERDE E PIOLHO CINZENTO

Detetamos a presença de novos focos destes insetos nos nossos POB's. Observe 100 rebentos (2 por árvore), caso contabilize 2% infestados por piolho cinzento e/ou 10 a 15 % por piolho verde, efetue um tratamento com um inseticida que contenha uma das seguintes substâncias ativas\*: deltametrina, flonicamida ou tau-fluvalinato.

\* substâncias ativas homologadas em simultâneo para piolho verde e piolho cinzento.

#### **BATATA**

#### MÍLDIO DA BATATEIRA

Efetue um tratamento de imediato com um produto de ação curativa. Face à previsão de precipitação apartir do final da próxima semana, repita o tratamento ao término persistência deste tratamento, posicionando-o preferencialmente antes da chuva.

# **EPITRIX SP-**

Já detectamos os primeiros sintomas, folhas com orifícios circulares e roídas nas bordaduras. Observe a sua cultura, na presença de sintomas adicione um inseticida à base de tiaclopride, acetamiprida.

NOTA: De acordo com o Oficio Circular nº3/2019, emitido pela DGAV a 7 de Fevereiro, encontra-se cancelada a utilização da substância ativa acetamiprida em cultura protegida, cancelamento em vigor desde o dia 13 de feverereiro de 2019.

Direção de Serviços de Desenvolvimento Agro-Alimentar, Rural e Licenciamento



AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL

Estação de Avisos da Bairrada Estação Vitivinícola da Bairrada Apartado 7 3781-907 Anadia

Telefone: 231 510 330 Fax: 231 510 331 E-mail: eabairrada@drapc.gov.pt

Divisão de Apoio à Agricultura e Pescas

## TECIA SOLANÍVORA - ALERTA FITOSSANITÁRIO

A *Tecia solanivora* é uma praga de quarentena que ataca os tubérculos de batata, tendo-se já registado a sua presença em Espanha, na Galiza e nas Astúrias.

A lagarta é semelhante à comum traça da batata, mas provoca orifícios e galerias de maior dimensão, com as galerias a penetrarem mais profundamente na polpa da batata.

Se observar batatas com sintomas suspeitos contacte, de imediato, os serviços da Direção Regional de Agricultura e Pescas.

#### **ACTINÍDEA - KIWI**

#### PSA DO KIWI

Reiteramos a importância da persistente implementação de medidas e práticas culturais que atuem ao nível da **prevenção da instalação e disseminação da doença** pelo pomar ao longo de todo o ciclo vegetativo da planta, tais como:

- Arranque e queima das plantas mortas e ramos atacados (varas negras) no local, evitando deslocações pelo pomar.
- Limpeza e desinfeção de máquinas e equipamentos.

# **CITRINOS**

# AFÍDEOS - PIOLHO VERDE

Observamos novos focos em jovens crescimentos. Observe as suas árvores de citrinos, caso contabilize 5-10% de

rebentos atacados por piolho verde realize um tratamento com um inseticida homologado para o efeito.

#### PSILA AFRICANA DOS CITRINOS- TRIOZA ERYTREAE

Relembra-se a <u>obrigatoriedade</u> de realização das medidas fitossanitárias por todos os proprietários ou detentores de plantas de citrinos localizadas nas freguesias da Zona Demarcada.)

DBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO FREQUENTE (INTERVALOS DE 2-3 SEMANAS) DE TODAS AS PLANTAS DE CITRINOS LOCALIZADAS EM ZONA DEMARCADA.

Para esta finalidade encontram-se homologados os produtos de uso profissional: EPIK SG, CONFIDOR O-TEQ, NUPRIDE 220 SL, ACTARA 25 WG e o de uso não profissional: POLYSEC ULTRA PRONTO.

- Confirmada a presença de sintomas da praga realize, de imediato, podas dos rebentos do ano e proceda à sua destruição por fogo ou enterramento no local.
- A comercialização de plantas de citrinos em zona demarcada só pode ocorrer em locais que cumpram os requisitos exigidos. <a href="http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV">http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV</a>.
- Proibição de movimentar qualquer planta ou parte de planta (ramos, folhas, ...., exceto frutos) do local.

Mantenha-se atento e, na presença de sintomas suspeitos, contacte a Direção Regional de Agricultura da sua área.

Consulte a lista atualizada de freguesias incluídas em Zona Demarcada em <a href="http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=221911&c">http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=221911&c</a> boui=221911

CONCELHO	(atualização 15-4-201 FREGUESIAS TOTALMENTE DENTRO DE ZONA DEMARCADA	FREGUESIAS PARCIALMENTE DENTRO DE ZONA DEMARCADA
AGUEDA	ÁGUEDA E BORRALHA	AGUADA DE CIMA
	FERMENTELOS	BARRÔ E AGUADA DE BAIXO
	RECARDÃES E ESPINHEL	BELAZAIMA DO CHÃO, CASTANHEIRA DO VOUGA E AGADÃO
	TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA	MAÇINHATA DO VOUGA
		PRÉSTIMO E MACIEIRA DE ALCOBA TROFA, SEGADÃES E LAMAS DO VOUGA
		VALONGO DO VOUGA
ALBERGARIA-A-VELHA	ALBERGARIA-A-VELHA E VALMAIOR	ALQUERUBIM
	ANGEJA	
	BRANCA	
	RIBEIRA DE FRÁGUAS	
NADIA	SÃO JOÃO DE LOURE E FROSSOS AMOREIRA DA GÂNDARA, PAREDES DO BAIRRO E ANCAS	AVELÂS DE CAMINHO
ANADIA	ARCOS E MOGOFORES	AVELĀS DE CIMA
	SÃO LOURENCO DO BAIRRO	MOITA
	TAMENGOS, AGUIM E ÓIS DO BAIRRO	SANGALHOS
		VILA NOVA DE MONSARROS
		VILARINHO DO BAIRRO
VEIRO	TODAS	
CANTANHEDE	SÃO CAETANO	ANÇĀ
	TOCHA VILAMAR E CORTICEIRO DE CIMA	CADIMA
	VIDAMAR E CORTICEIRO DE CIMA	CANTANHEDE E POCARIÇA CORDINHĂ
		COVÕES E CAMARNEIRA
		FEBRES
		MURTEDE
		OURENTĂ
		PORTUNHOS E OUTIL
		SANGUINHEIRA
		SEPINS E BOLHO
COIMBRA		ANTUZEDE E VIL DE MATOS
		BRASFEMES EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES
		SOUSELAS E BOTÃO
		TROUXEMIL E TORRE DE VILELA
ESTARREJA	AVANCA	
	BEDUÍDO E VEIROS	
	CANELAS E FERMELÄ	
	PARDILHÓ	
IOUEIDA DA EOZ	SALREU BUARCOS E SÃO JULIÃO	
FIGUEIRA DA FOZ	LAVOS	ALHADAS ALQUEIDÃO
	PAIÃO	ROM SUCESSO
	QUIAIOS	FERREIRA-A-NOVA
	SÃO PEDRO	MAIORCA
	TAVAREDE	MARINHA DAS ONDAS
		MOINHOS DA GÂNDARA
1101/0		VILA VERDE
ILHAVO LEIRIA	TODAS	AMOR
		MACEIRA
		MARRAZES E BAROSA
		MONTE REAL E CARVIDE
		PARCEIROS E AZOIA
IARINHA GRANDE	MARINHA GRANDE	VIEIRA DE LEIRIA
IFAI HADA	MOITA	
MEALHADA	BARCOUÇO CASAL COMBA	LUSO PAMPILHOSA
	MEALHADA, VENTOSA DO BAIRRO E ANTES	VACARIÇA
MIRA	CARAPELHOS	MIRA
	0.104 22.00	PRAIA DE MIRA
		SEIXO
MONTEMOR-O-VELHO		ABRUNHEIRA, VERRIDE E VILA NOVA DA BARCA
		ARAZEDE
		LICEIA
IURTOSA	TODAS	
OLIVEIRA DE FRADES	SÃO JOAO DA SERRA	ARCOZELO DAS MAIAS RIBEIRADIO
OLIVEIRA DO BAIRRO	BUSTOS, TROVISCAL E MAMARROSA	OLIVEIRA DO BAIRRO
	DIŠ	OLIVERNI DO BRIRNO
	PALHAÇA	
VAR	TODAS	
OMBAL		ALMAGREIRA
		CARRIÇO
·		LOURIÇAL
ÃO PEDRO DO SUL		MANHOUCE
SEVER DO VOUGA	COUTO DE ESTEVES	VALADARES CEDRIME PARADELA
	COUTO DE ESTEVES ROCAS DO VOUGA	CEDRIM E PARADELA PESSEGUEIRO DO VOUGA
	ROCAS DO VOUGA SEVER DO VOUGA	PESSEGUEIRO DO VOUGA
	SILVA ESCURA E DORNELAS	
	A F DOMINEDIO	
OURE		SAMUEL E VINHA DA RAÍNHA